

人類乳突狀病毒(HPV)疫苗接種後應注意事項：

1. 接種後於現場留置觀察約 30 分鐘，確認無不適症狀後才離開。
2. 接種後，請多喝水、多休息。如遇特殊反應時應盡速就醫，讓醫師做進一步的判斷與處置。
3. 接種疫苗後，雖可降低罹患子宮頸癌的機率(理論上可以預防 60-70% HPV 感染，但疫苗尚未涵蓋所有病毒型別，仍有可能罹患子宮頸癌。故仍須定期進行子宮頸抹片檢查，以維護身體健康。

人類乳突狀病毒(HPV)疫苗接種後可能發生的反應：

1. 本次接種使用的 2 價人類乳突狀病毒(HPV)疫苗，安全性已經通過衛生福利部食品藥物管理署核可，其常見的不良反應為注射部位疼痛或紅腫、暈眩、頭痛、疲倦、發燒等；不良反應多為輕度到中度，一般而言會自行緩解。
2. 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如：氣喘、呼吸困難、抽蓄等不適症狀應盡速就醫，請醫師做進一步的判斷與處置。
3. 若有關人類乳突狀病毒(HPV)疫苗任何疑問可洽詢：健康署 24 小時專線：0800-88-3513 或台北市衛生局 1999*1813

興雅國中健康中心-27232771*336.337